

Nota de caza (Coleoptera: Pyrochroidae)

Antonio SÁNCHEZ-RUIZ ⁽¹⁾ y José Ignacio LÓPEZ-COLÓN ⁽²⁾⁽¹⁾ Museo Nacional de Ciencias Naturales; Dpto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Entomología).
José Gutiérrez Abascal, 2; E-28006 Madrid.⁽²⁾ Plaza de Madrid 2; E-28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Comunicamos dos nuevos registros de *Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763) y *P. coccinea* (Linnaeus, 1761), especies relativamente escasas y localizadas. Los ejemplares son de la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

***Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763)**

1 ♀ etiquetada de la carretera Gedrez-Monasterio de Hermo [UTM: 29TPH9762], Cangas de Narcea (Asturias) (1.000 m de altitud), 3.VI.1995 (Antonio Sánchez-Ruiz, Manuel Sánchez-Ruiz, Prado Ingelmo Jiménez e Inés Álvarez García leg.).

El ejemplar se capturó magueando en un claro de un bosque de hayas (*Fagus sylvatica* L.) totalmente cubierto de vegetación muy alta, sobre todo gramíneas.

Esta especie se ha citado en la Península en Barcelona (Salardú), Lérida (Viella), Huesca (Piedrafita), Vizcaya (Traslaviña), Soria (Urbión) y Lugo (Seoane de Courel, Ferrería de Incio, Piornedo y Hospital) (ESPAÑOL, 1968; VÁZQUEZ, 1993; MELIC, 1994; DEVESA et al., 1995).

Es la primera cita para Asturias.

***Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761)**

1 ♂ etiquetado de Fonsagrada [UTM: 29TPH5173] (Lugo) (960 m de altitud), 3.VI.1995 (id. leg.).

Este ejemplar se capturó magueando en un claro de un pinar de *Pinus sylvestris* L., cubierto de gramíneas de porte elevado.

Se ha citado hasta ahora en los siguientes puntos peninsulares: Barcelona (Tordera), Lérida (Parque Nacional de Aiguës Tortes: Estany Llebre; Valle de Arán), Huesca (Valle de Ordesa), Navarra (Valle de Irati), Asturias (Covadonga), La Coruña (Caaveiro), Lugo (Sierra de Os Ancares), Zamora (Cervantes), norte de Portugal (Serra da Peneda: Albergaria), y Sistema Central (Sierra de Gredos) (ESPAÑOL, 1968; SERRANO, 1981; VÁZQUEZ, 1993; MELIC, 1994; DEVESA et al., 1995; LÓPEZ-COLÓN, 1996).

Esta segunda cita para Lugo sitúa también la especie al norte de la Sierra de Os Ancares.

Los ejemplares se capturaron en una campaña entomológica financiada por el Proyecto "Fauna Ibérica" III, SEUI-DGICYT PB92-0121.

BIBLIOGRAFÍA: DEVESA, S., VALCÁRCCEL, J.P., MEJUTO, C. & CERVIÑO, G. (1995). Presencia en Galicia (N.O. Península Ibérica) de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) y *Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763). (Coleoptera: Pyrochroidae). *Zapateri, Revta. aragon. ent.*, 5: 177-178. • ESPAÑOL, F. (1968). Entomofauna forestal española: La familia Pyrochroidae (Col., Heteromera). *Boletín del Servicio de Plagas Forestales*, 11(22): 111-113. • LÓPEZ-COLÓN, J.I. (1996). Nuevo registro ibérico de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) (Coleoptera: Pyrochroidae). *Boletín de la S.E.A.*, 15: 70. • MELIC, A. (1994). *Pyrochroidae* Latreille, 1807 aragoneses. *Catalogus de la entomofauna aragonesa*, 2: 11-12. • SERRANO, A.R.M., 1981. Contribución para o conhecimento de una nova familia de Coleópteros em Portugal. *Bol. Soc. port. Ent.*, 20: 1-3. • VÁZQUEZ, X.A., (1993). *Coleoptera Oedemeridae, Pyrochroidae, Pythidae, Mycteridae*. En Fauna Ibérica, vol. 5. Ramos M. A. et al. (eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, C.S.I.C., Madrid. 181 pp.

Observaciones sobre cría en cautividad de *Dysauxes punctata servula* (Berce, 1862)

Gareth KING

c/ Luis López Allué, 2 7º A; 50005 Zaragoza

El 6 de septiembre de 1997 capturé una ♀ de un ártido posteriormente identificado como *Dysauxes punctata servula* (Berce, 1862), en el municipio de Pina de Ebro (Zaragoza, 161 msnm). Se trata de una especie muy rara y localizada, citada de Teruel (Gómez Bustillo y Fernández Rubio, 1976; Tormo, 1997), Zaragoza y Huesca (Redondo, 1990). Su vuelo es diurno.

La ♀ depositó sus huevos en la caja utilizada para el transporte, sin fijarlos en el sustrato como indica Friedrich (1986). Las orugas neonatas eclosionaron a partir del día 14-IX-1997, es decir, pasados 8 días desde la puesta, siendo muy activas en la búsqueda de alimento. Gómez Bustillo y Fernández Rubio (1976) indican que la especie se alimenta en base a líquenes, aunque Friedrich (1986) destaca a *Taraxacum officinale* como planta huésped (al menos en cautividad). Las larvas se alimentaron con hojas (no muy frescas) de *Crepis* sp. (Compositae). Las larvas se mostraron muy sensibles a la luz, ocultándose entre la hojarasca tan pronto eran expuestas. Las orugas crisalidaron a partir del 9-X-1997, pasando un mínimo de 25 días en estado larvario, no llegando a hacer ningún tipo de capullo a pesar de las observaciones de Gómez Bustillo y Fernández-Rubio (1976). Los adultos emergieron a partir del 24-X-1997 y hasta el 3-XI-1997. Los ♂♂ fueron capaces de volar inmediatamente, mientras que las ♀♀ se desplazaban por el sustrato o permanecían inmóviles.

El apareamiento se desarrolló, generalmente, a partir de las primeras horas del día, permaneciendo los individuos acoplados hasta el atardecer. Es interesante destacar que se produjeron numerosos apareamientos múltiples entre los mismos ejemplares, variando desde dos a seis ocasiones.

Agradecimiento: A Víctor Redondo por haber verificado la identidad de la especie.

BIBLIOGRAFÍA: Friedrich, E. (1986). *Breeding butterflies & moths*. Harley Books, Essex, Reino Unido. • Gómez Bustillo, M. R. & Fernández-Rubio, F. (1976). *Mariposas de la Península Ibérica*. Tomo III, Heteróceros II. MAPA, Madrid. • Tormo, J. E. (1997): Una captura accidental interesante para la fauna de Aragón. *Saturnia*, 10: 50. • Redondo Veintemillas, V. M. (1990): *Las mariposas y falenas en Aragón. Distribución y catálogo de especies*. Diputación general de Aragón.