



NOTAS DEL CONSEJO DE LECTURA

En el anterior número de ZAPATERI (ZAPATERI, 3), y por una errónea interpretación del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, se deslizó un error en el artículo:

"Datos sobre la Anatomía, Biología y Ecología de los *Iberodorcadion* (Breuning, 1948) en sus diferentes estudios biológicos", por Antonio Verdugo Páez, pp. 81-91.

En el mencionado artículo se hace referencia a la especie *Iberodorcadion* (*Baeticodorcadion*) *nigrosparsum* y se le asigna a Pic, 1941. Esto es erróneo, pues si bien Pic en 1941 describe la variedad *nigrosparsum* de *Iberodorcadion* (*Baeticodorcadion*) *mucidum* (Dalman, 1817), fue Verdugo en 1993 quien eleva este taxón al nivel de especie; por lo tanto, deberá corregirse y deberá figurar como:

"*Iberodorcadion* (*Baeticodorcadion*) *nigrosparsum*. Verdugo, 1993".

Por lo tanto, en el mencionado artículo deberá tenerse en cuenta en:

- Pág. 83, 2.º párrafo, 4.ª y 5.ª líneas.
- Pág. 85, 1.º párrafo, 6.ª línea.
- Pág. 85, capítulo "Ninfosis", 2.º párrafo, 7.ª línea.

El autor, A. Verdugo, nos ha remitido una corrección a realizar en el tercer párrafo del apartado "**Oviposición y vida larvaria**", a partir del primer punto. La redacción definitiva debería ser:

..."Generalmente las especies propias de tierras bajas, pertenecientes a un subgénero u otro, necesitan de dos años para completar su desarrollo y dar lugar a una nueva generación de adultos, aunque de ese tiempo la fase larvaria ocupa sólo unos quince o dieciséis meses. Mientras tanto, las especies que ocupan biotopos de altura, también pertenecientes a cualquiera de los subgéneros, pueden necesitar hasta tres o más años para llegar a adultos; debido como se supondrá a

los dilatados periodos de diapausa que debe soportar la especie en su fase larvaria".

Debido a un **error tipográfico** (la ausencia de una *a*), la grafía original de *Microtyphlus canovase* Toribio y Beltrán, 1993 (Zapateri, *Revta. aragon. ent.*, 3, 1993), es incorrecta, por lo que la nueva grafía debe ser *Microtyphlus canovasae* Toribio y Beltrán, 1993.



Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) en el interior de la Península Ibérica

En dos excursiones realizadas a la Serranía de Albarracín, en agosto y primeros de septiembre de 1994, entre varias especies colectadas, tuvimos la fortuna de conseguir una serie de *P. sobrina* Dup., noctuido conocido en la Península Ibérica hasta ahora sólo del área pirenaica. El dato es de gran importancia, pues la localidad de Tramacastilla (Te.), situada a 1.260 m., constituye la cita más meridional para el continente europeo. Los adultos y genitalia no parecen diferir de otros ejemplares pirenaicos.

También merecen destacarse:

La geómetra *Crocallis albarracina* Wehrli, 1940 (fig. 1), endemismo centro-ibérico y la escasa *Evisa schawerdae* Reisser, 1930, que ya se conocía de dicha serranía.

Detalles: Javier Gastón Ortíz; Amboto, 7; 48990 Algorta (Vizcaya), y Víctor M. Redondo; Blancas, 8; 50001 Zaragoza.




Fig. 1